Juntanianti alimenalaminalaminala

Doight du neigne

Vass4R04s081-085



Collection Vassal-Montpellier

nlantanlantanlantaidantaid

2.7A6 Doight du neigne feulle ders 1.2et3

0Mtp311





dintroductorductoiductord



DESIGNATION : Doight du neigne CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 6 Vigueur : 3 PORT : (Fig) - ½ érig - couché Millerandage : 1 Date de Véraison : 10,8 Date de Maturité: 12-9-77 Pourriture : 0 GRAPPE : 6 23 H - P : E BAIE : TG - G - H - P disc. - Sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - M SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 5 avec pépins - apyrène s3 0 JUS : inc. - coloré , SAS

Doight du neigne in DISIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 6 (1.1.2.3) Vigueur : 2 PORT : (érig - (2 éris - couché Millerandage : O. Date de Véraison : 5.8 Date de Maturité : 16-9-87 Pourriture iq O GRAPPE : G - N - P : L - N - C BAIE: TG - G- M - P 24020 deprimee Oxte disc. - Sph. - ell. - Ov. - Oborlife cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (H) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 3, si 0 s2 3 avec pépins - apyrène 83 O JUS - coloré

Année:

4-746

Emplacement ... Désignation Doight du neigne

1	1 1	Nombre ! Total ! d'yeux!			DATES					
!!	!		10.3	!	1	!		_ ! !		
!	1 !	4	8	1 1	!	!	! !	!		
!	2 !	4	2		1	!		!		
!	3 !	4	1	!	!	i	10.3.72	1		
!	4 4!			!	!	pe	19 (a)	!		
!!	5 4!			!!!	!!	!	1	!		

Année: 1977 Emplacement ... 4.7 Ab. 112.3 ... Désignation / Doight du neigne

	! Nombre ! ! Total !	DATES									
	d'yeux!	7.3	10.3	!		i i					
1	; H ;	@ 4 x	!	!		!					
2	14	1	3 ×	ple	9-3-7+	+3					
3	6	0	2	!	į	į					
×	!!!!		!								
6	!!!!		!	!!!		!					

Année: 1948
Emplacement ... 4. 4 A6 11-2-3 Désignation Doight. du Neigne

	Nombre Total		DATES								
	d'yeux!	133!	!	<u>-</u>		!					
1	! 2 !	2 - !	1	!		!					
2	! 4 !	2. !	!	!!	!	!!					
3	16 !	3. !	!	! !	!	!					
4	!!!!	!	!	!	1	!					
9	! !	!	!	!	1						
	And the state and the		Di	e 33	3 - 78		==				

NOM Doight du Neigne EMPLACEMENT 4 R4 181.85

Souche	Nbre yeux	Débou	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor	Floraison début mi/f fin			raison mi/v	Maturité	
1 2 3 4 5	2 4 4 4	debut	mi/déb	grap 0	Grappe Pour: Baie:	: G TG - (disc-sp r : B-(: s : avec	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1 ; - P ! -ov-ol Rg-N r - fe	Dim: bov-cyl	Compac L-fus inc	cité	: L - M- C

ANNEE : 1996 HOM Daight du neigne EMPLACEMENT. 4 R4 181,85

ne												
ouche	Whre yeux	Company of the Compan			Ferti-	Flor		Véraison début mi/v fin			Maturité	
1	972	15.3 M3	25,3*	0								
3	6	11,3	18.31	0	Grappe	: G -		-	:	Compa	cité	: L - 1:- C
4 5	2	ALLA	18.3	0	Pour : Baie :	TC - C		- P]	Dim:	- fue		
	Du	18.3	96 (+2)		Couleu	<u>r</u> : B-0	Gr-Rs-	RJ-N	đus :	inc ·	- col	loré
					Pépins Fort :	: avec	e - ap		Lgueur	:		
		,										

ANUEEL: 1997

MOM Daight du neigne MPLACHMENT 4R4 181-85.

		ni										
iche	Nbre yeux		rrement mi/deb		Ferti- lité		raison mi/E	fin	ve debut	raison mi/v	fin	maturité
1 2 TL	4				14.5	215	£3.5	26.5	15.7	27-7	H8	15-9 +0
3	8		/	0	drappe	: (; -	H - F)Jim	: 6x6	Compa	cité:	1, - 11 -C-
d	4	/		0	Four :		MIL		0.1			
5 TL	13.			1	Baie :				im : D			
					Couleu	E : B-0	Gr-Rs-	Rg-N	Jus	: inc	- cc	oloré
					Saveur				ox - he	erb		
					a management of the second	: avec)- ap					
		,			Fort :			<u>v</u>	lgueur	: "		
							-					

AMMET.: 1398
WOM Doight du neigne EMPLACIMMENT. 4 R4881.85

iche	tibre yeux	Débou début	rranent mi/dab	Thre grap	Ferti- lité		mi/E		vé děbút	raison mi/v	fin	matur 11.6
だけない	13 11 13 10 10 -57			02122-7	Couleu Saveur	disc-s disc-s in : B-c in s -	+9 M - P Mil G - H ph-ell G - Rs- m - a	1 : - P -ov-o Rg-N r - f	Dim: bov-cy dus ox - h	l-fus : inc erb		17.9 E +5 : 1 ::- C

Désignation : Emplacement : Joight derneigne 4.7A68.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui D- moyon 2 - globuloux 3.

41 • glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé de vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses Oduveteuses O- cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 6 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Celoo 69

Désignation Poight du neigne Emplacement : 4-7-A6 s.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 62 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Désignation : Emplacement :

Doight du neigrae 4.7 A 6 +.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré (7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair O base 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : Emplacement : Joight du neigne 4,7 A 6 3,2

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 - petite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 42 séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 -35 aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté (5) Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tournonté (5) Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2)- vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2)- autre 3.
 - anglo pétiole/limbo: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. - Calvo 69

Doight du neigne 4.7 Ab (s-1-2-3) Nº d'ordre Désignation : Emplacement: 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé / - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Très grosse (1)- Grosse (2)- Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 26 × 22). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée 7 / pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.) 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 17 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 + apyrène 9. 31 - A pédicelle long () - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.) 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5 / long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 85

Doight du neigne 4.7A6 (s. 2.3)

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :..... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
ni Désignation: Doight du neigne
No d'ordre :
Origine :
Emplacement: dupl7 A6 & 4-2-3 + de s4-5
                                    poles 80.
8 - Angle des nervures ..... 0-2-3.
9 - L<sub>1</sub>/L .... 0-2-3.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 -(2) -(3)
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2)- 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : (1) - (2) - 3.
                         : (4)-(5)
                Médiane/Base : 6 - (7) - 8)
```